

Analyse und chemische Zusammensetzung der Fahlerze

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

der hohen

philosophischen Fakultät der kgl. Universität Breslau

eingereicht

und mit ihrer Genehmigung veröffentlicht von

Alfons Kretschmer

aus Preiland



Mittwoch, den 13. Juli 1910, Mittags 12 Uhr

im Musiksaale der Universität:

Vortrag:

„Über flüssige Krystalle“

und

Promotion



Leipzig

Wilhelm Engelmann

1910

Gedruckt mit Genehmigung der philosophischen Fakultät der Universität
Breslau.

Referent: Herr Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hintze.

Das examen rigorosum hat am 25. Mai 1910 stattgefunden.

Sonderabdruck aus:

»Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie.« XLVIII. Bd., Heft 5.

Meinem Vater

und

dem Andenken meiner Mutter.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41543115_0069

Analyse und chemische Zusammensetzung der Fahlerze.

Von

A. Kretschmer in Breslau.

(Mit 4 Textfigur.)

I. Teil. Die Fahlerzformeln und ihre Grundlagen.

1. Die verschiedenen Auffassungen.

Heinrich Rose stellte in seiner vorbildlichen Arbeit über die natürlichen Sulfosalze (Poggend. Annalen 1829, 15, 580) die Fahlerzformel $(Cu_2, Ag_2, Zn, Fe)_4(Sb, As)_2S_7$ auf, die bis zum heutigen Tage fast allgemein beibehalten wird, obwohl man öfters Bedenken dagegen erhoben und versucht hat, die chemische Zusammensetzung der Fahlerze anders zu formulieren. Petersen sah sich auf Grund neuer und älterer ausgewählter Analysen (N. Jahrb. f. Min. usw. 1870, 455) veranlaßt, der Formel $(Cu_2, Zn)_3(Sb, As)_2S_6$ »zur allgemeinen Bezeichnung des Fahlerztypus unbedingt den Vorzug zu geben.« Fünf sehr sorgfältige, mit dem Preise der königlich ungarischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft gekrönte Analysen von K. Hidegh (Tscher. Mitt. 1880, N. F. 2, 350) regten Kennigott zu seinen umfangreichen Berechnungen »Über die Fahlerzformel« an (N. Jahrb. f. Min. 1881, 2, 245) und führten ihn zu dem Ergebnis, daß in den Fahlerzen isomorphe Mischungen der Verbindungen $(Cu_2, Ag_2)_4(Sb, As)_2S_7$ und $(Fe, Zn)_3(Sb, As)_2S_6$ vorlägen. Nach langem Festhalten an Rose's Formel gelangte Rammelsberg (Mineralch. 1886, 95) ebenfalls durch zahlreiche Berechnungen zu der Formulierung: $(Cu_2, Ag_2, Fe, Zn)_4(Sb, As)_2S_7$ und $(Cu_2, Ag_2, Fe, Zn)_3(Sb, As)_2S_6$ und deren Mischungen. Aus zwei trefflich übereinstimmenden Analysen von Fraatz berechnete Hampe (Chemik.-Zeitg. 1893, 1691) die empirische Formel $(Cu_2, Ag_2, Fe, Zn)_7(Sb, As)_4S_{13}$ in Übereinstimmung mit Rammelsberg, oder, wenn er Kupfer und Silber als »Monosulfide« annahm, » $(Cu_2, Ag_2, Fe, Zn)_{12}Sb_4S_{13}$ «, die nach Luedecke (Min. d. Harzes 1896, 165) als morphotropes Gemisch von Sulfantimonit und Sulfantimoniat aufgefaßt wer-

den kann, entsprechend »3 [(Cu₂, Ag₂, Fe, Zn)₃ Sb S₃] + (Cu₂, Ag₂, Fe, Zn)₃ Sb S₄«. Zu dieser Auffassung ist zu bemerken, einmal, daß es ein Silbermonosulfid nicht gibt, zweitens, daß ein Kupfermonosulfid hier eben nicht angenommen werden darf, weil schon von H. Rose und seitdem immer wieder, insbesondere auch durch die Fraatz'schen Analysen selbst, in den Fahlerzen die gewöhnlichen Schwefelungsstufen der Metalle nachgewiesen worden sind, und endlich, daß Sulfantimonit und Sulfantimoniat chemisch richtig (Cu₂, Zn)₃ Sb₂ S₆ und (Cu₂, Zn)₃ Sb₂ S₈ zu schreiben wären. Tschermak (Mineralogie 1894, 364) zerlegt die empirische Formel der besten Analysen Cu₁₀ Zn₂ Sb₄ S₁₃ in die isomorphen Componenten Cu₃ Sb S₃ und Cu Zn₂ Sb S₄, die den Rotgiltigerzen und dem Stefanit, bezw. Geokronit entsprechen sollen. Endlich leiteten Prior und Spencer (Min. Soc. London 1899, 12, 493) aus fünf neuen Analysen Prior's die Formel Cu₆ Sb₂ S₆ + x Zn₆ Sb₂ S₉ ab.

2. Analysenberechnungen.

Da die Mineralchemiker Penfield's Forderung (diese Zeitschr. 1900, 33, 529) mit jeder Analyse zugleich auch die »nicht abgerundeten« Atomverhältniszahlen zu veröffentlichen nur selten erfüllt haben, so schien es zunächst geboten, die vorhandenen Analysen durchzurechnen, um auf diese Weise vielleicht Aufschluß über die Berechtigung der verschiedenen Formeln zu erlangen. Diese Aufgabe wurde wesentlich erleichtert durch das vollständige Verzeichnis der Fahlerzanalysen in C. Hintze's »Handbuch der Mineralogie« (49. Liefg. 1904, 1110—1119). Mit den Formeln von H. Rose oder Petersen und Rammelsberg stimmt eine Analyse überein, wenn sich die Summe der zweiwertigen und die halbe Summe der einwertigen Metallatome zusammengenommen wie 4 : 2 oder wie 3 : 2 verhält (Fall I). Die Formeln von Tschermak und Prior-Spencer kommen darin überein, daß sich die Summe der ein- und zweiwertigen Metallatome zu derjenigen der dreiwertigen wie 6 : 2 verhält (Fall III).

Für Kenngott's Formel war eine besondere Zahl zu berechnen, die man erhält, wenn man von vornherein (Zn, Fe)₃ Sb₂ S₆ subtrahiert und dann das Kupfer durch den Rest des Antimons dividiert (Fall II). Bei den Analysen 23—24, 48—50 und 109—112, die sehr nahe übereinstimmen (cf. Hintze, l. c.), habe ich die durchschnittlichen Procentzahlen angewandt. Die nach 1904 veröffentlichten Analysen bilden den Schluß der Tabelle. Alle berechneten Verhältniszahlen beziehen sich auf Antimon + Arsen = 2,00. Als Atomgewichte dienten diejenigen der internationalen Atomgewichtstabelle von 1908.

		Cu	Ag	Zn	Fe	Sb	As	S	incl.	I.	II.	III.	S ge- funden	S be- rechnet
1	Markirsch. H. Rose, Pogg. Ann. 1829, 15 , 577.	40,60	0,60	3,69	4,66	42,46	10,19	26,83	0,44 SiO ₂					
2	Desgl. Berthier, Ann. min. 1825, 11 , 421.	39,20	4,00	—	834	1036	43,59	8352		3,9	4,4	6,5	7,0	6,9
3	Wolffach. Klapproth, Beitr. 1807, 4 , 73.	6164	93	—	805	372	3333	7412		2,9	2,9	5,2	5,4	5,9
4	Desgl. H. Rose, Pogg. Ann. 1829, 15 , 579.	25,50	43,25	—	7,00	27,00	—	25,50		3,4	3,7	5,8	7,4	6,5
5	Desgl. Prior, Min. Soc. Lond. 1899, 12 , Nr. 56, 202.	4009	4229	—	4252	2246	—	7954		3,5	7,4	6,0	6,6	6,5
6	Schappach. Mutschler bei Hilger, Ann. Chem. Pharm. 185 , 205.	25,23	47,71	3,10	3,72	26,63	—	23,52	0,05 Pb	3,4	3,3	5,9	6,3	6,2
7	Freudenstadt. Hilger, Pogg. Ann. 1865, 124 , 500.	3967	4640	474	665	2341	—	7336	0,40 Bi	2,8	3,0	5,2	4,9	6,0
8	Neubulach. Seafter bei Petersen, N. Jahrb. f. Min. 1870, 464.	40,20	0,90	3,00	4,20	17,00	11,30	23,00	4,24 Co, 4,55 Bi	3,8	4,6	6,0	6,8	6,8
9	Moschel-Landsberg. Oellacher bei Sandberger, N. Jahrb. 1865, 595.	6321	83	457	764	4414	4453	7474	1,32 Pb, 6,33 Bi	3,7	4,4	6,4	6,3	6,7
40	Kahl. Mutschler bei Sandberger, N. Jahrb. f. Min. 1877, 275.	33,83	1,37	—	4145	4233	931	8228	17,32 Hg, 0,23 Co, 1,57 Bi	3,6	3,9	6,0	6,6	6,6
41	Sommerkahl. Petersen, Kaulsdorf. Hilger,	36,60	0,50	4,50	3,60	24,90	2,60	25,90	0,30 Co, 0,98 Bi	3,5	3,9	5,9	6,7	6,6
42	Pogg. Ann. 1865, 124 , 500.	5707	46	688	644	2072	347	8079	51 47	3,4	3,2	5,8	6,4	6,1
43	Mornshausen. Sandmann, Ann. Chem. Pharm. 1854, 89 , 364.	46,66	—	0,88	3,03	—	20,63	27,45	0,43 Pb, 2,95 Co, 1,83 Bi	3,3	2,0	5,2	6,5	6,3
44	Dillenbürg. H. Rose, Pogg. Ann. 1829, 15 , 578.	7336	0,22	3,84	4,85	45,05	10,94	28,34	21 500	3,6	4,0	6,0	6,5	6,6
45	Horhausen. Prior, Min. Soc. Lond. 1899, 12 , Nr. 56, 200.	32,04	20	587	868	4252	4359	8839	0,62 Pb, 0,83 Bi	3,6	4,0	6,2	6,5	6,6
46	Müsen. Hengstenberg bei Ram- meisberg, Mineralch. 1875, 407.	38,17	0,62	4,59	25,65	24,64	4,65	24,64	0,36 Pb, 0,92 Mn	3,2	3,3	6,0	6,3	6,2
47	Stahlberg bei Müsen. Sandmann wie bei Nr. 43.	6000	57	960	284	2434	220	7676	7 467	3,9	4,9	6,4	6,9	6,9
		38,42	0,83	6,85	4,52	25,27	2,26	25,03	0,36 SiO ₂	3,9	4,4	6,5	6,9	6,9
		6044	77	4047	272	2102	301	7807						
		44,55	—	2,63	4,02	28,32	—	24,33						
		6533	—	402	482	2356	—	7589						
		36,09	0,45	2,92	6,33	26,80	0,71	25,85						
		5675	4,4	447	4132	2229	95	8063						
		38,44	0,69	6,50	2,29	49,71	4,98	25,52						
		6039	64	994	409	1639	664	7960						

		0,60	3,50	3,43	49,15	4,93	25,46	4,4	4,9	6,9	7,4	7,4
48	Schwabengrube bei Müsen. Ram-	39,88	56	614	4593	657	7944					
	melsberg, Mineralch. 1875, 407.	6270	535	3,80	25,86	4,56	24,59	3,6	3,9	6,3	6,7	6,6
49	Landskrone, Aldendorf bei Ram-	6097	405	579	2451	208	7670					
	melsberg, ebenda.	37,95	0,67	2,52	2,24	28,78	—	3,2	3,2	5,7	6,7	6,2
20	Rammelsberg, Kerl, Berg- und	5967	62	385	404	2394	—	3,6	3,9	6,5	6,7	6,6
	Huttenm. Zeitg. 1853, 20.	35,70	8,90	—	4,50	26,80	—	3,6	3,9	6,5	6,7	6,6
21	Clausthal. Sanderb. Rammelsberg,	5613	825	805	2230	—	7317					
	Mineralch. 4. Suppl. 1843, 34.	33,15	5,14	5,77	28,52	—	25,65	3,6	3,9	5,9	6,7	6,6
22	Desgl. »Rosenhöfer Zug«. Schind-	5242	476	882	488	2373	8004					
	ling. N. Jahrb. 1856, 335.	35,65	3,36	5,29	2,36	28,63	—	3,5	3,8	6,0	6,6	6,5
23-24	Desgl. Fraatz bei Hampe,	5605	344	809	422	2382	7714					
	Chemiker-Zeitg. 1893, 17, 4694.	34,59	3,18	3,43	6,23	27,64	—	4,4	5,0	6,7	7,2	7,1
25	Desgl. »Silbersegen«. Kuhlema-	5439	324	524	4114	2210	7967					
	tschr. ges. Naturf. 1856, 8, 500.	37,50	3,00	—	6,50	29,00	24,50	3,4	3,6	5,9	5,4	6,4
26	Desgl. »Zilla«. Klaproth, Beitr.	5896	278	—	4163	2442	6706					
	1807, 4, 74.	34,48	4,97	5,55	2,27	28,24	—	3,7	4,4	6,3	6,6	6,7
27	Desgl. »Zilla«. H. Rose,	5736	460	849	406	2349	7714					
	Pogg. Ann. 1829, 15, 578.	37,18	4,58	5,00	3,94	27,38	0,67	3,5	4,3	6,3	6,6	6,8
28	Andreasberg. Kuhlemaun, wie bei	5846	446	763	705	2278	89					
	Nr. 25.	39,39	4,19	—	4,55	34,75	4,54	2,4	2,8	4,6	5,4	5,4
29	Desgl. »Andreasberg«. Jordan,	6493	440	—	277	2644	205					
	Journ. f. pr. Chem. 1837, 9, 92.	30,47	10,48	3,39	3,32	26,56	—	3,7	4,4	6,3	7,0	6,7
30	Meiseberg. Rammelsberg,	4794	974	518	629	2209	7785					
	Pogg. Ann. 1849, 77, 247.	34,53	7,27	3,25	4,36	26,44	—	3,7	4,3	6,3	6,9	6,7
34	Tannhöfer Gesenk. Ders.	4957	674	497	779	2499	7554					
	Ebenda.	32,46	7,55	3,00	4,19	25,74	—	3,8	4,3	6,5	7,2	6,8
32	Desgl. Ders. Ebenda.	5404	699	459	749	2444	—					
		38,78	—	3,59	5,03	28,87	—	3,7	4,2	6,3	6,2	6,7
33	Kamsdorf. Amelung b. Rammels-	6098	548	899	2402	7402	26,33					
	berg, Min. Ch. 2. Suppl. 1845, 54.	38,63	2,37	2,76	4,89	46,52	7,24	3,8	4,3	6,5	7,0	6,8
34	Gersdorf. H. Rose,	6074	249	422	875	4374	961					
	Pogg. Ann. 1829, 15, 577.	44,00	0,40	—	22,50	—	24,10	4,5	4,3	6,5	4,9	7,5
35	Freiberg (Junge hohe Birke). Klap-	6446	37	—	4025	—	3213					
	roth, Beitr. 1807, 4, 47.	48,00	0,50	—	25,50	—	44,00	8,9	—	13,0	3,3	44,9
36	Desgl. (Kroner). Ders. Ebenda.	7547	46	—	4564	—	1867					
		42,50	0,90	—	27,50	4,50	15,60	7,5	—	40,6	2,8	40,5
37	Desgl. (Prophet Jonas). Ders.	6682	83	—	4949	424	3449					
	Ebenda.											

1,64(Ni, Co)
2780,90Pb
430,78Pb
37

		Cu	Ag	Zn	Fe	Sb	As	S	incl.	I.	II.	III.	S ge- funden	S be- rechnet
38	Freiberg (Prophet Jonas). Plattner, Pogg. Ann. 1846, 67 , 422.	44,07 6457	—	8,89 4359	2,22 398	—	18,88 2547	28,14 8768	0,34 Pb 16	4,0	4,8	6,5	6,9	7,0
39	Desgl. Wandesleben, Chem. Jahresber. 1854, 844.	42,02 6607	0,06 5	1,89 289	8,44 4504	17,40 4448	2,40 320	27,27 8505		5,7	14,6	9,5	9,6	8,8
40	Desgl. (Weifgültig, Hab. Aecht).	44,81 2328	31,29 2899	0,99 451	5,98 4069	24,63 2049	—	21,47 6603		3,7	4,2	6,3	6,4	6,7
41	H. Rose, Pogg. Ann. 1829, 15 , 579.	40,25 6329	0,30 27	—	13,50 2415	23,00 4913	0,75 400	18,50 5770		5,7	15,9	8,7	5,7	8,6
42	Annaberg. Klaproth, Beitr. 1807, 4 , 67.	52,30 8223	0,54 50	—	0,79 444	1,42 118	16,78 2237	26,50 25,08		3,6	6,6	7,4	7,0	6,6
43	Kupferberg. Websky, Zeitschr. d. geol. Ges. 1871, 23 , 489.	34,34 5399	5,33 494	3,52 538	5,37 961	26,79 2229	—	7823		4,0	4,8	6,6	7,0	7,0
44	Gaibau. Krieg bei Rammelsberg, Mineralch. 1875, 405.	40,80 6259	26,40 4	2,00 220	2,40 849	23,00 4898	—	24,90 8032	40,80 Pb	3,5	3,8	5,5	8,4	6,5
45	Příbram. Mann bei Babanek, Tscherm. Mitt. N. F. 6 , 85.	34,36 4934	14,77 4359	—	3,30 590	34,09 2836	—	7767 3587	522 0,30 Al ₂ O ₃	2,6	2,6	5,6	2,5	5,6
46	Kremnitz. Klaproth, Beitr. 1795, 1 , 180.	39,84 6259	0,05 4	4,44 220	4,75 849	22,82 4898	4,75 633	25,75 8032		3,3	3,4	5,8	6,3	6,3
47	Herrngrund. Hidegh, Tscherm. Mitt. N. F. 2 , 356.	37,54 5903	—	4,07 464	5,21 932	19,34 4609	4,23 564	24,74 7716	7,87 Hg	4,4	5,0	6,8	7,4	7,0
48-50	Kotterbach. Scheidhauer, Pogg. Ann. 1843, 58 , 161.	35,33 5555	—	0,69 405	0,87 455	19,34 4609	2,94 392	22,53 7026	393 17,27 Hg, 0,21 Pb, 0,81 Bi	3,8	4,4	6,6	6,9	6,8
51	Desgl. G. vom Rath, Pogg. Ann. 1855, 96 , 322.	36,59 5753	0,44 40	—	7,41 4272	26,70 2221	—	25,90 8079	863 3,07 Hg	3,9	4,5	6,5	7,3	6,9
52	Desgl. v. Hauer, Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1852, 3 , 98.	34,23 5382	0,44 9	—	9,46 4690	33,33 2773	—	49,38 6045	433 178	3,3	3,5	5,2	4,4	6,3
53	Poracs (Andrei Berghandlung).	30,58 4808	0,09 8	—	4,46 361	25,48 2119	—	24,37 7604	46,69 Hg	3,3	3,5	5,6	7,2	6,3
54	Desgl. (Gustav Friederici). Ders. Ebenda.	32,80 5157	0,07 6	—	5,85 1046	30,18 2541	—	24,89 7764	834 279	3,4	3,2	5,2	6,2	6,4
55	Desgl. (H. Geist Transaction).	39,04 6138	0,12 44	—	7,38 4322	34,56 2626	—	22,00 6862	5,37 Hg	3,4	3,6	5,8	5,2	6,4
56	Desgl. (Rothbauer Stollen). Ders. Ebenda.	39,00 6132	—	—	7,50 4342	19,50 4622	—	26,00 8109	0,52 Hg 26 6,25 Hg 342	5,8	14,8	9,6	10,0	8,8

		Cu	Ag	Zn	Fe	Sb	As	S	incl.	I.	II.	III.	S ge- funden	S be- rechnet
76	Binnenthal. Prior, Min. Soc. Lond. 1899, 12 , 491.	44,42 6903	4,77 442	—	3,68 658	—	20,49 2732	26,94 8403		3,2	3,2	5,9	6,2	6,2
77	Außenberg. Fellenberg, Naturf. Ges. Bern 1864, 478.	38,17 6004	0,96 89	5,44 784	2,76 494	45,58 4296	11,49 4532	24,97 7789	0,38Pb, 0,58Bi 48 28	3,0	3,4	3,2	5,5	6,0
78	Annivierthal. Brauns, ebenda 1854, 57.	35,57 3552	—	2,04 307	3,85 688	8,80 732	40,96 4464	23,75 7408	4,94Bi 237	3,4	3,2	3,4	6,4	6,4
79	Creneuz. Brauns bei Petersen, N. Jahrb. f. Min. 1870, 590.	37,52 5899	0,04 3	—	6,54 1464	2,49 482	14,44 4325	29,40 9076	4,20Co, 43,07Bi 204 626	3,7	4,4	6,3	7,8	6,7
80	M. Avanza. v. Lill, Berg- u. Hüt- tenm. Jahrb. 13 , 24.	35,64 5604	0,18 16	8,49 4237	0,80 443	28,07 2335	—	24,74 7747	2,67Hg 433	3,7	5,0	6,4	6,6	6,7
81	Valle del Frigido. Bechi b. d'Achi- ardi, Min. Tosc. 1873, 2 , 342.	30,40 4732	—	—	43,08 2549	29,64 2463	—	27,04 8425		4,0	6,0	5,9	6,8	7,0
82	Desgl. Funaro bei d'Achiardi, Soc. Tosc. sc. nat. 1884, 474.	49,32 3038	0,04 3	—	12,67 2265	25,59 2429	—	29,60 9282	7,55Ni 4286	4,7	—	6,2	8,7	7,8
83	Val di Castello. Kersten, Pogg. Ann. 1843, 59 , 434.	35,80 5584	0,33 34	6,05 925	4,89 338	27,47 2285	—	24,47 7538	2,70Hg 435	3,7	4,4	6,4	6,6	6,7
84	Desgl. Bechi, Am. Journ. Sci. 1852, 14 , 60.	37,27 5934	0,45 44	6,23 953	4,64 293	26,52 2206	—	24,44 7529	3,03Hg 432	4,0	4,7	6,7	6,8	7,0
85	Calceña. Lettao, Ann. min. 1852, 1 , 407.	38,20 6006	—	—	5,90 1055	25,50 2421	—	24,30 7579	0,80Pb 38	3,9	4,3	6,7	7,4	6,9
86	Cangas de Onis. Paillete, Rev. min. 1833, 6.	34,51 5378	—	3,26 497	4,59 824	42,75 4064	—	28,86 9032		7,5	29,0	44,2	46,9	40,5
87	Corbières. Berthier, Ann. min. 1836, 9 , 329.	34,30 5393	0,70 60	6,30 948	4,70 304	25,00 2079	4,50 200	25,30 7894		3,5	3,7	5,9	6,9	6,5
88	Pontgibaud. Eissen b. Gonnard, Bull. soc. min. Par. 1882, 5 , 89, 48.	23,56 3704	19,03 4763	2,34 358	6,53 4468	22,30 4855	—	24,35 7595		4,6	6,5	7,5	8,2	7,6
89	Montschonay. Grüner bei Lamy, Bull. industr. min. 1869, 13 , 422.	42,92 6748	0,65 60	5,70 874	4,69 833	9,97 829	7,88 4056	26,37 8225		5,4	9,1	9,0	8,7	8,4
90	Les Ardillats. Mène, Compt. rend. 1864, 51 , 463.	32,00 5031	—	—	3,00 536	22,00 4830	8,00 4066	23,00 7205	12,00Pb 579	2,5	2,3	4,2	5,0	5,5
91	Fresney d'Oisans. Prior, Min. Soc. Lond. 1899, 12 , 497.	45,39 7486	—	—	4,32 236	28,85 2400	—	24,48 7695	0,11Pb 5	3,2	3,2	6,4	6,4	6,2
92	Valgodemar. Mène, Compt. rend. 1864, 52 , 4326.	30,80 4842	—	—	4,50 805	21,50 4788	40,00 4333	24,70 6768	11,30Pb 556	2,4	2,2	4,0	4,3	5,4

		Cu	Ag	Zn	Fe	Sb	As	S	incl.	I.	II.	III.	S ge- funden	S be- rechnet
115	Chile. Smith bei Dana, Min. 1868, 102.	36,02 3663	3,41 316	4,52 361	2,36 422	23,34 4930	3,05 406	26,83 8334		3,2	3,3	5,8	7,4	6,2
116	Machetillo. Domeyko, Min. 1879, 229.	36,70 5723	2,90 269	6,90 4055	4,20 415	20,70 1722	6,50 866	23,30 7894		3,3	3,4	5,6	6,4	6,3
117	Altar, Ovalle. Field, Qu. Journ. Chem. Soc. 1851, 4, 332.	36,72 5773	0,07 6	7,26 4410	4,23 220	20,28 1687	3,94 324	30,35 9466	0,03 <i>Atu</i> 2	3,8	4,4	6,4	8,6	6,8
118	San Pedro Nolasco. P. del Barrio b. Domeyko, Min. 1879, 232.	34,20 5377	0,20 18	—	2,00 358	29,40 2424	7,90 4053	24,30 7610		4,7	4,7	3,3	4,4	4,2
119	Teniente. Orezo b. Domeyko, Min. 1879, 229.	38,60 6068	—	6,80 4039	4,59 284	20,30 1688	—	30,50 9448		5,2	7,5	8,8	44,2	8,2
120	Algodon-Bai. v. Bibra, Journ. pr. Chem. 1863, 96, 204.	36,33 5745	0,58 33	—	4,29 767	18,00 4580	19,30 2573	49,66 6132		4,8	4,6	3,2	2,9	4,8
121	Desgl. Ders. Ebenda.	38,72 6088	0,45 44	—	6,33 4132	14,64 968	20,05 2673	21,44 6594		2,3	2,4	4,0	3,6	4,8
122	Manto, Punitaqui. Domeyko, Ann. min. 1844, 6, 483.	33,60 5235	—	—	4,50 268	20,70 4722	—	20,20 6304	24,00 <i>Hg</i> 4200	4,7	7,0	9,0	7,3	7,7
123	Lajarilla, Andacollo. Ders. Ebenda 1864, 5, 472.	39,00 6432	—	—	4,30 233	20,40 4697	4,00 533	24,30 7548	41,00 <i>Hg</i> 550	3,5	3,6	6,2	6,8	6,5
124	Fortuna, Talca. Castillo b. Domeyko, Min. 1879, 238.	32,27 5673	—	—	0,17 30	34,90 2903	—	27,85 8687	3,80 <i>Hg</i> 490	4,9	4,9	3,6	5,0	4,9
125	Vallenar, Huasco. Ebenda 239.	52,89 8316	—	—	4,19 243	42,83 4069	—	48,33 5747	3,83 <i>Hg</i> 492	8,5	4,6	47,0	40,7	44,5
126	Tres Puntas. Ders. Ebenda 394.	48,00 2830	36,90 3448	5,20 798	3,70 662	6,90 574	6,20 826	20,70 6457	24,40 <i>Hg</i> 420	6,8	17,8	14,2	8,1	9,6
127	Oruro. Ders. Ebenda 394.	27,40 4261	44,30 1325	0,60 94	6,60 4180	28,30 2354	—	24,00 6350		3,4	3,7	5,8	5,6	6,5
128	Aullagas. Ders. Ebenda 394.	23,80 3742	8,00 744	10,00 4529	4,70 839	30,50 2538	—	22,60 7049		3,6	4,7	5,4	5,6	6,6
129	Huanchaca. Gonzalez b. Domeyko, ebenda 395.	30,10 4732	42,43 1452	0,15 23	6,59 4178	32,98 2739	—	46,87 5262		3,0	3,0	5,2	4,0	6,0
130	Desgl. Salinas, ebenda.	26,40 4454	10,45 967	4,70 1942	—	25,25 2400	—	22,00 6862		4,3	6,3	6,7	6,5	7,3
131	Ubina. Kröber, Berg- u. Hüttenm. Zeitg. 1864, 23, 430.	41,30 1776	4,00 92	—	25,44 4492	21,74 4806	41,00 4467	24,03 7495	4,82 <i>Pb</i> , 0,04 <i>Ni</i> , 0,04 <i>Co</i> , 233 7 2 0,57 <i>Bi</i> 27	3,4	43,0	4,0	4,5	6,4

		7,19	2,38	7,19	14,75	25,12	2,77Pb		3,8	4,4	6,3	6,8
432	Morococha. Merbach bei Breit- haupt, Min. Stud. 1866, 408.	—	1099	426	598	7835	133					
433	Huallanca. Comstock, Am. Journ. Sci. 1879, 17, 401.	3,86	2,14	5,46	9,06	13,49	26,74		3,6	3,9	6,1	6,6
434	Araqueda. Raimondi, Min. Pér. 1878, 115.	6146	327	977	753	4798	8344		4,0	4,6	6,7	7,0
435	Jucad. Oresi b. Raimondi, ebenda 116.	42,00	0,55	4,88	17,24	7,67	23,51		4,0	4,6	6,7	7,0
436	Recnay. Raimondi, Min. Pér. 1878, 424.	6604	54	75	1,681	4,434	7333		3,2	3,3	5,7	6,2
437	Desgl. Ders. Ebenda.	43,30	—	2,00	4,00	6,12	16,78	8,91Pb	4,4	3,0	5,7	7,3
438	Desgl. Ders. Ebenda.	6808	—	306	715	509	2237	434	4,7	16,7	6,8	7,7
439	Aciosupa. Ovalle bei Domeyko, Min. 1879, 239.	44,38	40,26	6,37	10,59	25,36	1,46	8,83Pb	4,0	8,0	5,6	7,2
440	Lagueda. Fonseca, ebenda 232.	2264	954	974	1894	2109	495	632	5,4	18,0	8,4	7,3
441	Hualgayoc. Domeyko, ebenda 394.	48,78	43,44	2,75	10,02	22,49	1,02	47	3,6	4,0	6,1	6,6
442	El Purgatorio. Klaproth, Beitr. 1807, 4, 80.	2953	4217	421	4792	1874	436	4,75Pb	4,6	1,5	2,8	4,0
443	Durango. Bromeis, Pogg. Ann. 1842, 55, 417.	44,38	41,92	1,93	9,12	24,74	0,56	84	2,0	4,9	6,7	7,0
444	Soto Mine. Burton, Am. Journ. Sci. 1868, 45, 320.	2261	1144	295	4634	2058	75	26	4,2	5,4	6,9	7,2
445	Lake City. Genth, Am. Phil. Soc. 1885, 23, 38.	37,60	—	4,14	24,00	—	—	0,10Mn, 0,37Bi	3,4	3,6	5,6	6,7
446	Great Eastern Mine. Page b. Mallet, diese Zeitschr. 9, 629.	40,80	23,95	—	7,00	23,50	—	48	3,3	3,3	5,6	6,3
447	Mollie Gibson Mine. Penfield, Am. Journ. Sci. 1892, 44, 18.	27,00	10,25	—	4,42	25,97	—	57	2,2	1,8	3,5	5,2
448	Arizona. Clarke, Am. Chem. Journ. 1880, 2, 173.	4245	949	5,02	7,14	38	7628	4,9Pb	4,4	4,5	7,0	7,0
449	Prescott. Genth, ebenda 1868, 45, 320.	5835	401	767	794	2161	—	0,86Pb	3,5	3,7	6,2	6,5
450	Arkansas. S. Smith, ebenda 1867, 43, 67.	4309	4347	353	764	2295	—	784	4,2	4,8	7,2	8,2
		37,68	0,60	7,15	0,64	25,54	3,22	47	3,4	3,6	5,6	6,7
		5926	55	4093	144	2122	429	8100	2,2	1,8	3,5	5,8
		23,20	—	1094	246	2868	—	57	4,4	4,5	7,0	7,0
		3648	—	6,90	0,42	0,13	17,18	41	4,4	4,5	7,0	7,0
		35,72	43,65	4055	75	14	7810	4,91Pb	3,5	3,7	6,2	6,5
		5616	4265	—	0,56	24,72	—	784	4,2	4,8	7,2	8,2
		33,53	4,80	—	4,00	2056	—	—	3,4	3,5	5,9	7,1
		5272	167	—	4,00	2056	—	—	3,4	3,5	5,9	7,1
		38,16	3,21	6,23	4,05	21,67	—	—	3,4	3,5	5,9	7,1
		6000	297	952	188	2052	—	—	3,4	3,5	5,9	7,1
		36,40	2,30	4,20	1,89	26,50	—	—	3,4	3,5	5,9	7,1
		3723	213	642	338	2204	—	—	3,4	3,5	5,9	7,1

		Cu	Ag	Zn	Fe	Sb	As	S	incl.	I.	II.	III.	S ge- funden	S be- rechnet
451	Arkansas. S. Smith, Am. Chem. Journ. 1867, 43, 67.	33,20	4,97	6,10	0,82	27,04	0,64	25,32		3,4	3,5	5,8	6,8	6,4
452	Mac Makin Mine. Genth, ebenda 1853, 16, 83.	5220	460	936	447	2247	84	7897						
453	Desgl. De Benneville bei Genth, Min. N. C. 1894, 27.	30,73	40,53	2,53	4,42	17,76	44,55	25,48		2,3	2,2	4,3	5,3	5,4
454	Elldridge Mine. Taylor bei Genth, Am. Journ. Sci. 1835, 19, 45.	4832	975	387	254	1477	1540	7947	0,45 Mn 82	3,9	4,4	6,6	7,0	6,9
455	Newburyport. Ellen Swallow, Proc. Bost. Soc. 1875, 17, 465.	37,45	6,47	5,67	2,05	6,99	43,49	26,25		3,3	3,5	5,7	6,6	6,3
456	Capelton. Harrington, Trans. Roy. Soc. Can. 1883, 1, 80.	5888	599	868	367	584	1779	8284		3,9	4,5	6,6	8,0	6,9
457	Kaslo-Slocan. Johnston bei Hoffmann, Am. J. Sci. 1895, 50, 273.	35,85	2,30	5,45	2,16	25,87	—	27,60	0,25 Pb 42	3,9	4,3	6,6	7,2	6,9
458	Monzaia, Algier. Ebelen, Ann. min. 1847, 11, 47.	42,09	0,24	4,86	8,77	4,52	15,34	27,99		3,2	3,4	5,1	5,6	6,2
459	Bellegarda. Zecchini b. Novarese, Boll. R. Corn. Geol. It. 1902, 23.	6618	49	697	674	376	2065	8734		3,6	4,0	6,3	6,9	6,6
460	Silvester bei Urbeis. Ungemach, Bull. Soc. franc. Min. 1906, 19.	22,44	44,20	6,22	0,93	28,22	0,23	24,68		3,0	3,0	5,2	5,3	6,0
461	Desgl. Ders. Ebenda.	3484	1038	934	466	2348	34	6762	4,63 Bi 78	3,7	4,1	6,4	6,6	6,7
462	Markirch. Dürr, diese Zeitschr. 47, 303.	44,57	—	2,24	4,66	14,77	9,12	27,25		3,9	4,5	6,5	7,0	6,9
		6536	—	342	833	4228	1246	8499		3,9	4,5	6,8	7,2	6,9
		32,76	4,54	0,38	1,46	27,90	0,84	20,60	13,74 Hg					
		3450	439	58	261	2324	442	6425	686					
		38,45	—	5,05	3,77	17,47	6,75	25,58	4,63 Bi					
		6000	—	772	674	4453	900	7978	78					
		34,45	5,94	4,86	3,79	25,24	4,24	25,22						
		5369	550	743	678	2400	464	7866						
		42,43	—	4,40	3,48	42,44	9,74	27,00						
		6624	—	673	623	4034	4300	8422						

3. Die Berechtigung der einzelnen Formeln.

Läßt man als Bereich für den Fall I 2,8—3,2 (Petersen) und 3,8—4,2 (Rose), für den Fall II 3,8—4,2 und für den Fall III 5,8—6,2 gelten, so entsprechen den Formeln von Petersen 18, von Rose 36, von Kenngott 29 und von Tschermak und Prior-Spencer 42 Analysen. Diese Geltungszahlen unter 156 Analysen sind nun nicht so verschieden, daß sie die Entscheidung für eine der Formeln rechtfertigen würden. Es bleibt daher noch zu untersuchen, ob durch berechtigte kritische Auswahl der Analysen ein eindeutiges Ergebnis erzielt werden kann. Als Kriterium für die Verwendbarkeit einer Sulfidanalyse zur Formelgewinnung hat von jeher der Grad der Übereinstimmung des berechneten mit dem gefundenen Schwefel gedient. Lassen wir in unserem Falle eine Analyse zur Formelberechnung noch zu, wenn sich die Verhältniszahl des gefundenen Schwefels von der des berechneten um $\pm 0,3$ unterscheidet, so entspricht dies z. B. bei der Analyse Nr. 40 einer Schwefeldifferenz von 0,83 %, bei Nr. 144 einer solchen von 0,91 %. Außerhalb dieser weiten Grenzen fallen nicht weniger als 73 Analysen, die also für die Formelberechnung ausscheiden. Damit soll über die Richtigkeit dieser, sowie der verbleibenden 83 Analysen kein Urteil gefällt werden, weil der von der Berechnung abweichende Schwefelgehalt vielfach auf unreines Material zurückzuführen sein dürfte. Unter diesen Voraussetzungen entsprechen den Formeln von Petersen die Analysen Nr. 5, 11, 15, 54, 76, 78, 94, 100, 135, zusammen 9, von Rose Nr. 1, 7, 16, 17, 18, 25, 34, 38, 43, 47, 48, 66, 84, 84, 85, 103, 105, 113, 138, 153, 156, 164, 162, zusammen 24, von Kenngott Nr. 9, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 40, 59, 60, 62, 64, 69, 83, 103, 106, 109, 133, 140, 158, 160, zusammen 24 und von Tschermak und Prior-Spencer Nr. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 46, 59, 60, 64, 64, 76, 80, 84, 83, 94, 94, 100, 106, 123, 133, 140, 148, 160, zusammen 29 Analysen.

Auch diese Geltungszahlen (9, 24, 24, 29 unter 82 Analysen) sind offenbar für keine der Formeln beweisend. Dagegen wird jetzt der Standpunkt Rammelsberg's begreiflich, der für seine Auffassung nicht nur die für Rose und Petersen sprechenden Analysen, sondern auch die zahlreichen Zwischenglieder heranzieht. Diese äußere Vermittelung der nun einmal bestehenden Gegensätze erscheint jedoch durch Preisgabe der über isomorphe Mischungen geltenden Anschauungen zu teuer erkaufte. Die Hoffnung, daß sich nach Berechnung von 156 Fahlerzanalysen die richtige Formel gleichsam von selbst herausstellen müsse, ist also nicht in Erfüllung gegangen. Die überaus große Zahl unbrauchbarer Analysen bedeutet für den Analytiker die ernste Forderung sorgfältiger Auswahl und Prüfung der zu verwendenden Apparate und Methoden.

II. Teil. Zur Analyse der Fahlerze.

4. Das Aufschlußmittel.

Durch die mustergültigen Analysen natürlicher Sulfosalze bewies H. Rose, daß man sich des Chlors zum Aufschluß sulfidischer Erze mit großem Vorteil bedient. Das Wesentliche dieser Methode und ihr Vorzug gegenüber dem Schmelzen eines Erzes mit Soda und Salpeter oder der Auflösung in Königswasser beruht darin, daß mit diesem Aufschluß eine Trennung des Arsens und Antimons von Kupfer, Silber und Blei verbunden ist. In einigen seiner Verwendungsarten ist das Chlor durch das weniger heftig wirkende Brom ersetzt worden. Brand (Zeitschr. anal. Chem. 1887, **26**, 222) versuchte den Aufschluß sulfidischer Erze durch Brom und fand, daß derselbe die gleiche quantitative Trennung bewirke wie der Chloraufschluß, die Handhabung sogar bedeutend bequemer sei. Jannasch (Ber. d. deutsch. chem. Ges. Berlin **24**, 3746 und **25**, 124) hat dann die bei diesem Verfahren einzuhaltenden Bedingungen ausprobiert und festgestellt, daß die erwähnte Trennung genauer ist als die im Chlorstrom. Schäfer (Ztschr. anal. Chem. 1906, **45**, 145—174) gibt wieder dem Chlor den Vorzug, das niemals versage, während Brom einige einfache Sulfide, wie Kupferglanz und Zinkblende, zumal wenn sie völlig eisen-, arsen- und antimonfrei seien, nicht immer völlig aufschließe. Wenn Schäfer meint, das Chlorverfahren habe in der langen Zeit seit 1829 jedenfalls immer geleistet, was man von ihm verlangt habe, sodaß kein Grund zur Anwendung einer neuen Methode vorliege, so möchte ich ihn z. B. auf Guillemain's »Beiträge zur Kenntnis der Sulfosalze« (In.-Diss. Breslau 1898, 3) hinweisen, welcher »durch Vergleich aller mit diesem (Chlor-)verfahren ausgeführten Analysen desselben Minerals den merkwürdigen Umstand fand, daß für die einem Sulfosalze zugeschriebene Formel Blei stets zu niedrig, Antimon und Arsen stets zu hoch bestimmt waren.« Guillemain mußte, weil er hauptsächlich Bleispießglanze untersuchte, auf den Chloraufschluß ganz verzichten. Einen weiteren Beweis für die Mängel der Chlormethode bringt Schäfer selbst bei, indem er sich zu deren Behebung genötigt sieht, zwischen Substanz und Vorlage einen auf der constanten Temperatur von 300° zu erhaltenden Asbestpfropf einzuführen, der die teilweise flüchtigen Blei- und Kupferchloride vollständig zurückhalten, die Arsen-, Antimon- und Schwefelchloride dagegen quantitativ hindurchlassen soll. Zu dem von Schäfer festgestellten Vorzuge der allgemeinen Anwendbarkeit der Chlormethode sei bemerkt, daß bei völlig arsen- und antimonfreien Sulfiden dem Halogenaufschluß, der ja hauptsächlich wegen der damit erreichten Trennung von diesen Elementen angewandt wird, nur geringe Bedeutung zukommen dürfte. Ich arbeitete anfangs mit Chlor, wandte mich aber dann, von dessen unangenehmen Eigenschaften belehrt, der Brommethode zu, die mir in der Folge das, was

ich nach den Angaben von Jannasch von ihr erwartete, zuverlässige, quantitative Trennung des Kupfers und Bleis von Arsen und Antimon und eine bequeme Handhabung voll und ganz geleistet hat.

Das reinste käufliche Brom wird durch Schütteln mit Bromkaliumlösung von Chlor und durch wiederholtes Waschen mit Wasser wieder von den Kaliumhalogeniden und von Schwefelsäurespuren befreit. Die Lösungen werden mittels Kugelscheidetrichters vom Brom getrennt. Zur Trocknung läßt man das Brom mehrmals aus trockenen Scheidetrichtern bis auf geringe Reste ab und leitet dann eine halbe Stunde getrocknetes Kohlendioxyd hindurch.

5. Der Aufschlußapparat.


Der von H. Rose angegebene Apparat ist vielfach abgeändert worden. Insbesondere hat man die verschiedensten Vorlagen verwendet, um vollständige Absorption der Destillate mit leichter Entleerbarkeit zu vereinigen. Als wesentlicher Fortschritt ist die Anordnung zu betrachten, wonach die Substanz nicht unmittelbar in das Reactionsrohr gewogen, sondern in einem glasierten Porzellanschiffchen in ein Rohr aus schwer schmelzbarem Kaliglas gebracht wird. Große Schwierigkeiten bereitet die einwandfreie Verbindung der einzelnen Teile des Apparates. Kautschuk kann seines Schwefelgehaltes wegen nicht verwendet werden, Kork erweist sich in mehrfacher Hinsicht als unzulänglich. Einmal lassen sich mit Korken, wenn sie durchbohrt werden müssen und sich die Anwendung großer Gewalt verbietet, für Halogene völlig undurchlässige Verbindungen nach meinen Erfahrungen nicht herstellen. Ferner wird Kork, ebenso wie Kautschuk, sehr bald angegriffen und saugt sich mit dem Halogen und dem wertvollen Sublimat voll, sodaß Korkverbindungen als beständige Fehlerquellen anzusehen sind. Endlich kann man das an den Wänden des Reactionsrohres haftende Sublimat nicht bis über die nächste Korkverbindungsstelle hinaustreiben, und muß daher nach jedem Aufschluß das Reactionsrohr oberhalb des Korken abschneiden.

Versuche mit einem der seither benutzten Apparate führten mich zu einer neuen Anordnung, die alle diese Übelstände mit Sicherheit vermeidet.

Das Reactionsrohr wird mit der ersten Vorlage zusammengeschmolzen, sodaß die flüchtigen Bromide von ihrer Entstehung bis zu ihrer Absorption keinerlei Verbindungsstelle zu passieren haben. Alle übrigen Verbindungen von der Bromflasche an bis zur letzten Vorlage werden durch gute Glaschliffe hergestellt. Auf diese Weise ist jeder Verlust und jede Verunreinigung ausgeschlossen. Man kann den Aufschluß am Arbeitsplatze vornehmen, ohne die geringste Belästigung zu erfahren. Der Aufbau des Apparates ist aus der beigegebenen Zeichnung auf S. 498 ersichtlich.

Dem Kipp'schen Apparat ist ein aus zwei verstellbaren Gefäßen bestehender Kohlensäureapparat vorzuziehen, weil dieser niemals versagt.

Die Bromflasche wird hochgestellt, um ein (bei den Fehlerzen allerdings nicht erforderliches) Erwärmen zu ermöglichen. Die nächste Flasche war zur nochmaligen Trocknung des Gasstroms durch Glaswolle bestimmt. Indessen machte ich, ebenso wie Schäfer, die Erfahrung, daß Glaswolle von Halogenen angegriffen wird, sodaß ich bald auf diese Trocknung verzichtete. Die Glasspirale soll etwas Beweglichkeit in das starre System



bringen. Sie ermöglicht es z. B., nachdem der Apparat mit Bromdampf angefüllt ist, das Schiffchen in das Reaktionsrohr zu bringen, ohne den Aufbau zu verrücken. Bei vorsichtigem Übertreiben des Sublimats genügen zwei Péligotrohre, um alles zu absorbieren. Überschüssiges Brom wird in eine Alkalicarbonatlösung geleitet. Als Vorlageflüssigkeit dient Wasser mit ein wenig Salzsäure, Salpetersäure und etwa 2 g Weinsäure.

6. Der Aufschluß.

Sobald der Apparat mit Bromdampf gefüllt ist und man sich überzeugt hat, daß alle Verbindungsstellen schließen, bringt man das Schiffchen mit der feingepulverten Substanz (etwa 4 g) in das Reaktionsrohr. Eine Flamme hinter der Substanz verhindert ein Rückwärtsdestillieren, das bei etwaigem Versagen des Kohlensäurestromes eintreten könnte. Die Geschwindigkeit des Gasstroms ist nur so groß zu nehmen, daß er eben den Druck der Vorlagen überwindet (in der Regel etwa vier Blasen in der Secunde). Das Erz wird eine Zeitlang der Einwirkung des Broms in der Kälte überlassen. Alsdann erwärmt man gelinde mit der Flamme eines kleinen Bunsenbrenners und treibt das entstehende Sublimat langsam in die Vorlage, so daß alles bequem absorbiert werden kann. Bei dieser niedrigen Temperatur wird das schädliche Zusammenschmelzen oder -sintern des Erzes vermieden. Wenn dann bei dieser geringen Erwärmung kein Sublimat mehr entsteht, so wird in den weitaus meisten Fällen der Aufschluß beendet sein. Man überzeugt sich davon durch größere Erwärmung mit einem Vierflammenbrenner, wobei also in der Regel kein helles Sublimat mehr entstehen soll. Andernfalls setzt man die stärkere Erwärmung fort, bis die Substanz an

einem Punkte zu schmelzen beginnt, treibt das entstehende Sublimat über und wiederholt dieses Verfahren nach Bedarf. Zusammenschmelzen der Substanz ist zu vermeiden. Es ist unnötig, erschwert später das Auflösen der im Schiffchen verbleibenden Bromide und kann bei längerem, zu starkem Erhitzen zur Verflüchtigung von Blei- und Kupferbromid führen. Daraus folgt, daß die Trennung im Bromstrom, ebenso wie jede analytische Trennungsmethode, natürlich nur dann quantitativ sein kann, wenn man die ausprobierten Bedingungen auch sorgfältig beobachtet. Bei richtigem Arbeiten ist die Beendigung des Aufschlusses mit Hilfe des Vierflammenbrenners leicht und sicher zu erkennen. Man läßt den Bromkohlen säurestrom im Gange, bis das Reactionsrohr erkaltet ist. Dann wird die Bromflasche ausgeschaltet und eine Zeitlang nur Kohlen säure durch den Apparat geleitet, um völlige Absorption des zwischen den Vorlagen befindlichen Sublimats zu verbürgen.

7. Zur Analyse der flüchtigen Bromide.

Man bringt die Vorlagenflüssigkeit quantitativ in eine Porzellanschale. Etwa an den Wänden der Vorlage haftende Partikel lösen sich in concentrirter Salzsäure. Nun verdampft man bis zur Vertreibung des Broms unter wiederholtem Zusatz von einigen Tropfen Salpetersäure. Die letztere verhindert eine Reduction der nichtflüchtigen Arsensäure, während bei Gegenwart von arseniger Säure starker Arsenverlust eintritt.

So waren bei der Analyse eines Arsenfahlerzes, bei welcher dieser Zusatz von Salpetersäure versäumt worden war, nach dem Abdampfen auf etwa 30 ccm Lösung nur noch 0,1036 g statt 0,1417 g Arsen vorhanden. Man bestimmt den abgeschiedenen Schwefel auf gewogenem Filter, fällt die Schwefelsäure im siedenden Filtrat durch die ungefähr berechnete Menge siedender Baryumchloridlösung und entfernt das überschüssige Baryum durch Schwefelsäure. Das Filtrat hiervon wird wiederum unter Zusatz von Salpetersäure auf etwa 30 ccm eingeengt, mit stärkstem Ammoniak übersättigt und mit Magnesiamixtur versetzt. Die Weinsäure hält Antimon und Eisen in Lösung. Der Arsenniederschlag wird filtriert, in Salzsäure aufgelöst, mit Ammoniak wieder gefällt und durch den Filtertiegel filtriert. Zum Waschen verwendet man Ammoniakwasser mit einem Zusatz von Salmiak. In bloßem Ammoniakwasser, das meist als Waschwasser empfohlen wird, löst sich, wenn das Filter so gut wie salzfrei geworden ist, eine kleine Menge des Niederschlages auf und fällt in dem angesäuerten Filtrat wieder aus. In den angesäuerten Filtraten wird das Antimon durch Schwefelwasserstoff gefällt, durch den Goochtiiegel filtriert und lediglich mit kaltem Wasser gewaschen. Die weitere Behandlung des Antimonsulfides erfolgt im Kohlen säurestrom bei 300° C. nach der Anordnung von Henz (Zeitschr. anorg. Chemie 1903, **37**, 48). Die Sulfidmethode nach Henz-

scher Anordnung ist eine der zuverlässigsten und bequemsten der analytischen Chemie überhaupt und dürfte die umständliche Tetroxydmethode Bunsen's vollständig verdrängen. So ergaben 1) 0,2034 g Sb_2O_3 0,1687 g Sb statt 0,1690 g, 2) 0,1597 g Sb_2O_3 0,1328 g Sb statt 0,1329 g, 3) 0,2744 g Sb_2O_3 0,2277 g Sb statt 0,2284 g, Resultate, die ich nach Bunsen's Methode auch nicht annähernd erzielen konnte. Im Antimonfiltrat werden geringe Mengen Eisen und Zink mit Schwefelammonium gefällt.

Ist Quecksilber und Wismut zugegen, so muß der Gang dieses Teils der Analyse geändert werden. Man kann Quecksilber in Sulfosalzen sehr leicht und sicher nachweisen, indem man das Erzpulver in einem Reagensglase erwärmt. Bei Anwesenheit von Quecksilber bildet sich über der Substanz ein schwarzer Ring, der bei geringen Mengen aber auch von den anderen Sublimaten verdeckt werden kann. In diesem Falle schüttet man die Substanz aus dem Röhrchen, löst den Beschlag in Königswasser und erkennt das Quecksilber durch die Reduction mit Zinnchlorür.

Man verzichtet hier auf die Schwefelbestimmung, vertreibt das Brom durch Einleiten von Kohlensäure und fällt durch Schwefelwasserstoff. Die Trennung der Sulfide erfolgt durch Schwefelammonium. Das auf dem Filter bleibende Schwefelwismut wird durch warme Salpetersäure, das Schwefelquecksilber durch Königswasser gelöst. Wismut und Quecksilber werden beide am sichersten als Sulfide im Filtriegel bestimmt. In beiden Fällen befreit man die Sulfide von Verunreinigung durch Schwefel mittels Extraction im Schwefelkohlenstoffdampf nach Friedheim und Michaelis (Zeitschr. anal. Chem. 1895, **34**, 256). Das im Schwefelammonium gelöste Arsen- und Antimonsulfid wird durch Säure wieder gefällt, durch Asbest filtriert und durch Salzsäure vom S. G. 1,19 getrennt. Der Schwefel wird nach Fresenius durch besonderen Aufschluß mit Soda und Salpeter bestimmt. Da diese Schwefelbestimmung die genaueste ist und neben der Hauptanalyse ausgeführt werden kann, so empfiehlt es sich schon der Zeitersparnis halber, diese Methode überall da anzuwenden, wo genügend Material zur Verfügung steht. Jedoch ergibt die bereits beschriebene Schwefelbestimmung in der Vorlageflüssigkeit trotz der Anwesenheit von Salpetersäure ebenfalls ausreichende Resultate.

8. Zur Analyse der nichtflüchtigen Bromide.

Die im Schiffchen verbliebenen Bromide werden am besten in Salpetersalzsäure gelöst und mit Salzsäure gekocht, um das Bromsilber in Chlorsilber überzuführen. Einige Tropfen Salzsäure vom S. G. 1,19 lösen auch das mitunter am Schiffchen angebackene leicht vollständig auf. Das Chlorsilber wird von der Gangart durch warmes, verdünntes Ammoniak getrennt. Ist nur wenig Silber vorhanden, so gelingt diese Trennung ganz gut. Bei

größerem Silbergehalt löst sich der Niederschlag auch bei mehrmaligem Behandeln mit Ammoniak meist nicht vollständig auf.

Man entfernt dann das Ammoniak, gibt concentrirte Salzsäure auf das Filter und nach einiger Zeit einige Tropfen Salpetersäure. Behandelt man jetzt den Niederschlag von neuem mit Ammoniak, so geht er vollständig in Lösung. Das Filtrat von Gangart und Silberbromid wird zur Trockne verdampft, um die Salpetersäure zu vertreiben. Für eine gute Bestimmung des Bleis als Sulfat ist darauf zu achten, daß die Lösung möglichst wenig freie Säure enthalte. Man muß den Niederschlag längere Zeit im Becherglase auf dem Wasserbade absitzen lassen und das Verdampfte von Zeit zu Zeit durch Alkohol ersetzen, um einer zu starken Concentration vorzubeugen. Zur quantitativen Trennung des Kupfers vom Zink durch Schwefelwasserstoff müssen pro 100 ccm Lösung zunächst mindestens 5 ccm concentrirte Schwefelsäure vorhanden sein; wenn nichts mehr ausfällt, verdünnt man die Lösung mit dem gleichen Volum Wasser und leitet dann Schwefelwasserstoff ein, bis die Lösung völlig farblos ist. Die Trennung des Eisens von Zink usw. erfolgt am besten durch die Succinatmethode. Die Lösung muß sehr genau neutralisirt werden: freie Säure macht Bernsteinsäure frei, in welcher der Niederschlag ein wenig löslich ist, durch freies Alkali werden Spuren der übrigen Metalle mitgefällt. Man erwärmt die Eisenoxydlösung mit kleiner Flamme, weil sich der Niederschlag in der Wärme besser absetzt, und läßt die Succinatlösung aus einem Hahntrichter tropfenweise zu. Nach beendeter Fällung läßt man erkalten, decantiert mehrmals und wäscht mit kaltem Wasser. Bei Beachtung dieser Regeln liefert diese von mir ausschließlich angewandte Methode durch einmalige Fällung eine ausgezeichnete Trennung, wie einige Beispiele zeigen mögen: 1) Angewandt 0,1119 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ neben 0,0611 g $ZnSO_4$, 0,0238 g $MnCl_2$; gefunden 0,0227 g Fe statt 0,0224 g. 2) Angewandt 0,0987 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ neben 0,164 g $ZnSO_4$, 0,0429 g $NiCl_2$, 0,0390 g $CoCl_2$; gefunden 0,0496 g statt 0,0498 g Fe . Eine ähnlich genaue Trennung konnte mit keiner anderen Methode erzielt werden. Für die Zink-Nickeltrennung ergab folgende Methode befriedigende Resultate. Man neutralisirt die saure Lösung möglichst genau, gibt pro 100 ccm Lösung drei Tropfen concentrirte Schwefelsäure zu und leitet vier Stunden in der Kälte Schwefelwasserstoff ein. So wurde z. B. aus 0,1181 g Zinkvitriol und 0,104 g Nickelchlorür 0,0263 statt 0,0269 g Zink erhalten.

III. Teil.

Die chemische Zusammensetzung der Fahlerze.

Das Analysenmaterial wurde mir von dem Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. C. Hintze in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt. Die Fahlerze von Kupferberg, Kapnik, Botés, Kotterbach, Hornachuelos und

Cook's Kitchen entstammen den hiesigen Sammlungen, diejenigen von Schemnitz, Müsen, Horhausen, Algier und Guanaxuato wurden durch Krantz in Bonn bezogen. Herr Geheimrat Hintze vermittelte auch freundlichst die Überlassung der Fahlerze von San Lorenzo durch den nun verstorbenen Herrn Johannes Brunner in Magdeburg, von Brixlegg und Dillenburg aus der Berliner Sammlung durch Herrn Geheimen Bergrat Professor Dr. Liebis und aus der Greifswalder Sammlung durch Herrn Professor Dr. Milch. Ihnen allen sage ich besten Dank.

Da hier eine größere Zahl von Fahlerzen zusammen mit ihren Analysen vorliegt, so kann die Frage nach der Ursache der Strichfarbe leicht entschieden werden. Es bestätigt sich die Ansicht der Herren Prior und Spencer, daß hoher Eisengehalt den schwarzen Strich bedinge, während eisenfreies Fahlerz roten Strich zeigen würde. Der nur 0,23% Zn enthaltende Tennantit mit rotbraunem Strich zeigt, daß der Zinkgehalt auf die Farbe ohne Einfluß ist.

9. Neue Analysen.

I.

Fahlerz von Horhausen, Westerwald, Rheinprovinz.

Krystalle auf derbem gelblichweißem Eisenspat, in Gesellschaft mit linsenförmigem Siderit, rotbrauner Zinkblende und Bleiglanz. Herrschend Pyramidentetraëder, untergeordnet Tetraëder gleicher Stellung. Prachtvoller Metallglanz. Strich rotbraun. Bruch muscheliger. Dichte 5,079. Um den Bleiglanz sicher zu entfernen, wurde die Substanz mit Salzsäure behandelt. Angewandt wurde 0,6846 g und für die besondere Schwefelbestimmung 0,4450 g.

<i>Cu</i>	37,75	5935	} 5945	2,47	} 2,98
<i>Ag</i>	0,44	40			
<i>Zn</i>	6,54	995	} 1226	0,51	
<i>Fe</i>	4,40	497			
<i>Pb</i>	0,74	34	} 2409	—	1,00
<i>Sb</i>	28,66	2384			
<i>Bi</i>	0,53	25	} 7676	—	3,49
<i>S</i>	24,64	7676			
	99,98			berechnet:	3,24

II.

Fahlerz von Hornachuelos, Provinz Cordoba, Spanien.

Derb, mit weißen Quarzadern durchwachsen. Metallglanz. Strich grauschwarz. Dichte 4,68. Bruch uneben bis schwachmuskelig. Für die Analysen wurden quarzfreie Stückchen ausgewählt. Angewandt wurde bei a. 0,7068 g, bei b. 0,8212 g.

	a.	b.	Mittel:			
<i>Cu</i>	38,97	38,93	38,95	6134	6136	2,52
<i>Ag</i>	0,01	0,03	0,02	2		
<i>Zn</i>	2,25	2,18	2,21	338		
<i>Fe</i>	4,65	4,89	4,77	852		
<i>Sb</i>	27,09	26,92	27,00	2246	2433	4,00
<i>As</i>	1,32	1,49	1,40	187		
<i>S</i>	25,56	25,76	25,66	8004		
			400,01		berechnet:	3,24

III.

Fahlerz von Huanchaca, Süd-Bolivia.

Das derbe Fahlerz wechselt mit Quarzlagen ab, die von zahlreichen Kiespunkten durchsetzt sind. Metallglanz. Strich grauschwarz, kaum noch mit rötlichem Stich. Bruch muschelrig. Dichte 4,769. Angewandt 1,2548 g.

Cu	29,99	4715	5895	2,59	3,02
Ag	12,74	1180			
Zn	2,49	381	984	0,43	
Fe	3,29	589			
Pb	0,25	14	2275	—	4,00
Sb	26,42	2198			
As	0,58	77	7396	—	3,25
S	23,71	7396			
	99,47			berechnet:	3,23

IV.

Fahlerz von Schemnitz, Ungarn.

Es stand mir eine doppelseitige Stufe zur Verfügung, deren eine Seite nur mit Fahlerzkrystallen, deren andere nur mit Pyritkrystallen besetzt ist. Herrschend stark glänzendes Tetraëder, untergeordnet rauhes, schwarzes Gegentetraëder. Strich rotbraun. Bruch uneben bis schwachmuschelig. Dichte 4,780. Angewandt 1,1440 g und für die besondere Schwefelbestimmung 0,2998 g.

Cu	37,93	5964	6006	2,48	3,00
Ag	0,45	42			
Zn	7,57	1157	1264	0,52	
Fe	0,60	107			
Sb	26,12	2173	2418	—	4,00
As	1,84	245			
S	25,21	7863	—	—	3,25
	99,72			berechnet:	3,26

V.

Fahlerz von der Grube Aurora bei Dillenburg in Nassau.

Krystalle mit Quarz, Bleiglanz, Kupferkies, Malachit. Herrschend Tetraëder, dessen Ecken durch das Rhombendodekaëder dreiflächig abgestumpft

werden. Lebhafter Metallglanz. Strich rotbraun. Bruch uneben. Dichte 4,736. Das Erz ist trotz des schönen äußeren Glanzes mit Kupferkies gemengt, sodaß es schwer hält, zur Analyse geeignete Stückchen zu gewinnen. Angewandt 0,9743 g und für die Schwefelbestimmung 0,7208 g.

<i>Cu</i>	38,52	6066	} 6073	2,47	} 2,98
<i>Ag</i>	0,08	7			
<i>Zn</i>	7,05	1078	} 1246	0,51	
<i>Fe</i>	0,94	168			
<i>Sb</i>	25,26	2101	} 2459	—	1,00
<i>As</i>	2,69	358			
<i>S</i>	25,22	7866	—	—	3,20
	99,76			berechnet:	3,23

VI.

Fahlerz von Kapnik, Ungarn.

Krystalle auf Quarzdruse, in Gesellschaft mit gelbbrauner Zinkblende. Habitus: Tetraëder mit untergeordnetem Rhombendodekaëder. Metallglanz. Strich rotbraun. Bruch muschelrig. Dichte 4,794. Angewandt 0,5785 g und für die besondere Schwefelbestimmung 0,4944 g.

<i>Cu</i>	38,59	6068	} 6134	2,58	} 3,06	
<i>Ag</i>	0,68	63				
<i>Zn</i>	6,16	942	} 1130	0,48		
<i>Fe</i>	1,05	188				
<i>Sb</i>	24,98	2078	} 2378	—	1,00	
<i>As</i>	2,25	300				
<i>S</i>	25,35	7906	—	—	3,32	
<i>SiO₂</i>	0,14			berechnet:	3,26	
	<u>99,20</u>					

VII.

Fahlerz vom Berge Botés in Siebenbürgen.

Quarzstufe mit Pyrit und großen Fahlerzkrystallen, an denen ein stark glänzendes Tetraëder vorherrscht. Untergeordnet das rauhe, schwarze Gegentetraëder und ein Pyramidentetraëder derselben Stellung. Bruch muschelrig. Strich rotbraun. Dichte 4,87. Angewandt bei a. 1,1289 g, bei b. 1,1664 g und für die besondere Schwefelbestimmung unter b. 0,6934 g.

	a.	b.	Mittel:				
Cu	36,10	36,11	36,10	5676	} 5816	2,46	} 3,01
Ag	1,54	1,52	1,51	140			
Zn	6,40	6,48	6,44	985	} 1302	0,55	
Fe	0,71	0,85	0,78	139			
Pb	2,76	2,68	2,72	131	} 2364	—	1,00
Mn	0,31	0,21	0,26	47			
Sb	24,09	23,90	24,00	1997	} 367	—	3,34
As	2,63	2,88	2,75	367			
S	24,96	25,02	24,99	7795	—	—	3,28
SiO ₂	0,50	0,15	0,32			berechnet:	
			100,13				

VIII.

Altes Fahlerzvorkommen von der Schwabengrube bei Müsen im Siegerland (Vorkommen des Linnéits).

Derbes Erz, stellenweise dicht besetzt mit Kryställchen, von denen die größeren das Pyramidentetraëder und das Tetraëder gleicher Stellung erkennen lassen. Bruch uneben, Farbe lichtgrau, mitunter finden sich Löcher und graue Quarzkörnchen. Metallglanz. Strich noch deutlich rotbraun. Dichte 4,779. Angewandt 4,0060 g und für die zwei besonderen Schwefelbestimmungen 0,1988 g und 0,1948 g. Es wurden 23,95 und 23,72% Schwefel gefunden.

<i>Cu</i>	33,30	5234	} 5392	2,13	} 2,84
<i>Ag</i>	1,70	158			
<i>Zn</i>	5,32	813	} 1791	0,71	
<i>Fe</i>	2,66	476			
<i>Pb</i>	0,83	40	} 424		
<i>Ni</i>	2,49	424			
<i>Hg</i>	0,75	38	} 2532	—	4,00
<i>Sb</i>	23,44	1933			
<i>As</i>	4,48	599	} 7433	—	2,94
<i>S</i>	23,83	7433			
<i>SiO₂</i>	0,26			berechnet:	3,27
	99,06				

Die Verhältniszahlen dieser Analyse weichen von denen der vorhergehenden erheblich ab. Die große Zahl der Bestandteile läßt auf mechanische Beimengungen schließen. Da fast 3% Schwefel fehlen, so scheinen nicht sulfidische Erze vorhanden zu sein; der geringe Schwermetallgehalt deutet auf Verbindungen, in denen das Verhältnis von Kupfer zu Antimon kleiner als 3:1 ist, und der hohe Antimon-Arsengehalt auf Arsenide oder Antimonide. Wenn man nun von vornherein 207 *NiAs* oder *NiSb* subtrahiert, so bleiben ungefähr die gewöhnlichen Fahlerzverhältnisse übrig.

<i>Cu</i>	5392	2,32	} 3,00
<i>Zn</i>	1584	0,68	
<i>Sb</i>	2325	—	1,00
<i>S</i>	7433	—	3,20
		berechnet:	3,34

IX.

Fahlerz von Kotterbach in der Zips, Ungarn.

Derbes Erz, das von zahlreichen Kupferkies- und Barytadern durchwachsen ist. Völlig kiesfreies Material ließ sich nicht gewinnen. Dennoch wurde das Erz analysiert, um den Quecksilbergehalt festzustellen. Farbe

dunkel, Glanz sehr schwach, Strich schwarz. Dichte 4,651. Angewandt bei a. 1,0674 g, bei b. 1,0780 g und für die besondere Schwefelbestimmung 0,2924 g.

	a.	b.	Mittel:		
<i>Cu</i>	40,60	40,53	40,57	6379	} 6382
<i>Ag</i>	0,04	0,02	0,03	3	
<i>Zn</i>	1,51	1,72	1,64	246	} 4132
<i>Fe</i>	4,55	4,51	4,53	810	
<i>Hg</i>	1,59	1,46	1,52	76	} 2389
<i>Sb</i>	20,43	20,76	20,60	1713	
<i>As</i>	5,09	5,14	5,07	676	} 7863
<i>S</i>	25,04	25,29	25,21	7863	
<i>BaSO₄</i>	0,72	0,77	0,75		
			99,89		

Zieht man von vornherein 174 *CuFeS₂* ab, so bleibt:

<i>Cu</i>	6208	2,60	} 3,00
<i>Zn</i>	958	0,40	
<i>Sb</i>	2389	—	1,00
<i>S</i>	7515	—	3,15
		berechnet:	3,20

X.

Fahlerz vom Groß-Kogel bei Brixlegg in Tirol.

Schwarze, matte Rhombendodekaëder auf Dolomit, zusammen mit grauen Dolomitrhomboëdern und weißem Baryt. Bruch uneben. Die Substanz ist vielfach durch braune Stellen verunreinigt, die ebenso wie die schwarze Oberfläche nach Möglichkeit entfernt wurden. Auf den Bruchflächen schwacher Metallglanz. Strich schwärzlich, der rote Ton noch erkennbar. Dichte 4,738. Angewandt wurde von der mit Salzsäure behandelten Substanz bei a. 0,4014 g, bei b. 0,8315 g und für die Schwefelbestimmungen bei a. 0,1364 g, bei b. 0,1514 g.

	a.	b.	Mittel:			
<i>Cu</i>	40,95	40,87	40,91	6432	} 6453	} 2,56
<i>Ag</i>	0,27	0,19	0,23	21		
<i>Zn</i>	—	4,85	4,85	744	} 1244	} 0,49
<i>Fe</i>	2,69	2,46	2,57	460		
<i>Hg</i>	—	0,80	0,80	40	} 2516	} —
<i>Sb</i>	—	15,77	15,77	1312		
<i>As</i>	—	9,03	9,03	1204	} 8216	} —
<i>S</i>	26,21	26,48	26,34	8216		
			100,50		berechnet:	3,28

Damit ist auch in dem Brixlegger Fahlerzvorkommen Quecksilber nachgewiesen.

XI.

Fahlerz von Algier (Collection de A. A. Damour).

(Nach Ansicht des Herrn Geheimrat Hintze von Mouzaïa).

Derbes Erz mit einzelnen, stark glänzenden Krystallflächen, von erbsengelbem Siderit vielfach durchwachsen, wodurch sich die bröckelige Beschaffenheit des Erzes erklärt. Bruch uneben, Strich schwarz, Dichte 4,740. Das Erz wurde durch Behandlung mit Salzsäure vom Eisenspat befreit. Angewandt 0,9355 und für die besondere Schwefelbestimmung 0,1429 g.

<i>Cu</i>	42,35	6658	}	2,59	}	2,98
<i>Ag</i>	0,09	8				
<i>Zn</i>	1,48	226	}	0,39		
<i>Fe</i>	4,31	771				
<i>Sb</i>	14,51	1207	}	—	}	4,00
<i>As</i>	10,24	1365				
<i>S</i>	26,38	8229		—		3,20
	<u>99,36</u>			berechnet:		3,18

XII.

Fahlerz von der Grube San Lorenzo, Santiago, Chile.

Bruchstücke großer Krystalle, zuweilen mit matten, zum Teil geriefen Krystallflächen, zusammen mit derbem Kupferkies und Buntkupfererz. Viele Stücke zeigen poröse, schlackenartige Beschaffenheit und sind dann hellgrau gefärbt. Bruch uneben, bei den besten Stücken schwachmuschelig. Strich sehr dunkel rotbraun. Wenig lebhafter Metallglanz. Dichte 4,597. Angewandt bei a. 0,9433 g, bei b. 1,2398 g und für die besondere Schwefelbestimmung bei a. 0,2722 g, bei b. 0,3444 g.

	a.	b.	Mittel:				
<i>Cu</i>	42,11	41,99	42,05	6624	}	6624	}
<i>Ag</i>	0,04	0,04	0,04	3			
<i>Zn</i>	6,02	6,17	6,09	931	}	1496	
<i>Fe</i>	1,55	1,42	1,48	265			
<i>Sb</i>	11,00	10,75	10,87	904	}	2573	}
<i>As</i>	12,47	12,68	12,57	1669			
<i>S</i>	27,03	27,22	27,12	8478	—	—	}
			<u>100,22</u>				
					berechnet:	3,25	

XIII.

Fahlerz von Guanajuato in Mexico.

(Collection de A. A. Damour.)

Unregelmäßig verwachsene Krystalle und stenglige Aggregate mit großen Zwischenräumen, vollständig überzogen mit grau-gelb-grüner Kies-

rinde. Das Fahlerz selbst ist vollkommen gleichartig, von ausgezeichnet muscheligem Bruch und prachtvollem Metallglanz. Strich schwarz. Dichte 4,576. Angewandt wurde bei a. 0,6560 g und für die besondere Schwefelbestimmung 0,1608 g, bei b. 0,6025 g.

	a.	b.	Mittel:					
<i>Cu</i>	42,15	—	42,15	6627	6748	2,58	3,07	
<i>Ag</i>	1,38	1,24	1,31	121				
<i>Zn</i>	2,62	—	2,62	400				
<i>Fe</i>	5,44	—	5,44	908	4308	0,49		
<i>Sb</i>	4,81	4,51	4,66	387				
<i>As</i>	16,60	16,75	16,68	2224	2611	—	1,00	
<i>S</i>	27,61	—	27,61	8611				—
			100,47			berechnet:	3,29	

XIV.

Fahlerz (Julanit) von der Grube Friederike Juliane bei Kupferberg in Schlesien.

Schwarze traubige Anhäufungen kleiner Krystalle in Kalkspat. Strich grauschwarz, den roten Ton nur sehr schwach zeigend. Dichte 4,692. Angewandt 0,6130 g und für die besondere Schwefelbestimmung 0,1287 g. Das Material wurde der Stufe entnommen, an welcher Websky eigenhändig das Resultat seiner Analyse vermerkt hat.

<i>Cu</i>	48,50	7625	7646	2,82	3,00
<i>Ag</i>	0,23	21			
<i>Fe</i>	2,77	495	—	0,18	
<i>Sb</i>	2,44	203	2712	—	1,00
<i>As</i>	18,82	2509			
<i>S</i>	27,04	8434	—	—	3,11
Rückstand	0,44			berechnet:	3,09
	100,24				

XV.

Tennantit von Cook's Kitchen, Illogan bei Redruth in Cornwall.

Eine mit kleinen, unvollständigen, dodekaëdrischen Krystallen besetzte Schicht auf Buntkupfererz. Die Krystalle sind außen schwarz, innen lichtgrau und schwach glänzend. Bruch uneben. Dichte 4,746. Strich rotbraun. Angewandt 0,7637 g.

<i>Cu</i>	53,24	8371	—	3,43	} 3,56
<i>Zn</i>	0,23	35	} 317	0,43	
<i>Fe</i>	4,58	282			
<i>As</i>	48,29	2439	—	—	4,00
<i>S</i>	26,54	8278	—	—	3,39
Rückstand	0,23			berechnet:	3,34
	100,41				

Da der gefundene Schwefelgehalt mit dem berechneten übereinstimmt, wenn man das Eisen als Fe_2S_3 annimmt, so liegt nach der Art des Vorkommens die Annahme einer Vermischung der Fahlerzsubstanz mit Buntkupfererz nahe, die dadurch höchstwahrscheinlich wird, daß nach Abzug von 317 Cu_3FeS_3 in der Tat die gewöhnlichen Fahlerzverhältnisse übrig bleiben.

<i>Cu</i>	7420	3,04
<i>As</i>	2439	4,00
<i>S</i>	7327	3,00

In diesem Sinne lassen sich auch die bereits vorhandenen Tennantitanalysen auffassen, sodaß der Tennantit als eine seltene Fahlerzvarietät mit dreiwertigem Eisen anzusehen und von dem eigentlichen Arsenfahlerze mit nur zweiwertigem Eisen zu trennen ist.

10. Die allgemeine empirische Fahlerzformel.

Die empirischen Formeln der von mir untersuchten Fahlerze sind, wenn ich der Einfachheit halber unter *Cu* die einwertigen, unter *Zn* die zweiwertigen und unter *Sb* die dreiwertigen Elemente verstehe:

- I. ($Cu_{2,47}, Zn_{0,51}$)_{2,98} *Sb* $S_{3,19}$, berechnet 3,24.
- II. ($Cu_{2,52}, Zn_{0,49}$)_{3,00} *Sb* $S_{3,28}$, — 3,24.
- III. ($Cu_{2,59}, Zn_{0,43}$)_{3,02} *Sb* $S_{3,25}$, — 3,23.
- IV. ($Cu_{2,48}, Zn_{0,52}$)_{3,00} *Sb* $S_{3,25}$, — 3,26.
- V. ($Cu_{2,47}, Zn_{0,51}$)_{2,98} *Sb* $S_{3,20}$, — 3,23.
- VI. ($Cu_{2,58}, Zn_{0,45}$)_{3,06} *Sb* $S_{3,32}$, — 3,26.
- VII. ($Cu_{2,46}, Zn_{0,55}$)_{3,01} *Sb* $S_{3,34}$, — 3,28.
- VIII. ($Cu_{2,13}, Zn_{0,71}$)_{2,84} *Sb* $S_{2,94}$, — 3,27.
- IX. ($Cu_{2,60}, Zn_{0,40}$)_{3,00} *Sb* $S_{3,15}$, — 3,20.
- X. ($Cu_{2,56}, Zn_{0,49}$)_{3,05} *Sb* $S_{3,27}$, — 3,28.
- XI. ($Cu_{2,59}, Zn_{0,39}$)_{2,98} *Sb* $S_{3,20}$, — 3,18.
- XII. ($Cu_{2,57}, Zn_{0,46}$)_{3,03} *Sb* $S_{3,29}$, — 3,25.
- XIII. ($Cu_{2,58}, Zn_{0,49}$)_{3,07} *Sb* $S_{3,29}$, — 3,29.
- XIV. ($Cu_{2,52}, Zn_{0,18}$)_{3,00} *Sb* $S_{3,11}$, — 3,09.
- XV. ($Cu_{3,43}, Zn_{0,13}$)_{3,56} *Sb* $S_{3,39}$, — 3,34.

Die allgemeine empirische Fahlerzformel lautet somit:

$$(\overset{\text{I}}{\mathbf{M}}_x, \overset{\text{II}}{\mathbf{M}}_y) \overset{\text{III}}{\mathbf{M}}_3 \mathbf{S}_3 + \frac{y}{2},$$

worin

$$\overset{\text{I}}{\mathbf{M}} = \text{Cu, Ag,}$$

$$\overset{\text{II}}{\mathbf{M}} = \text{Zn, Fe, Pb, Hg, Mn, Ni,}$$

$$\overset{\text{III}}{\mathbf{M}} = \text{Sb, As, Bi.}$$

$$x + y = 3,00 \quad \text{ist.}$$

Die in dieser Formel symbolisierten, unmittelbaren Ergebnisse meiner Analysen sind:

I. Das Verhältnis: Kupferatome plus Zinkatome zu Antimonatomen ist constant und gleich drei.

II. Das Verhältnis: Kupferatome zu Zinkatomen ist variabel, wie folgende Zahlen zeigen: ($\text{Zn} + \text{Fe}$ usw. = 1,00).

<i>Cu + Ag</i>	3,40	4,46	4,75	4,86	4,87	5,16	5,28	5,32	5,43
Analyse Nr.	VIII	VII	IV	I	V	XIII	X	II	VI
<i>Cu + Ag</i>	5,55	5,99	6,48	6,67	15,45	26,41			
Analyse Nr.	XII	III	IX	XI	XIV	XV			

III. In den Fahlerzen liegen die gewöhnlichen Schwefelungsstufen der Metalle vor: Cu_2S , Ag_2S , ZnS , FeS , Hg_2S , PbS , MnS , Sb_2S_3 , As_2S_3 , Bi_2S_3 .

Der experimentelle Teil meiner Aufgabe ist mit diesen empirischen Feststellungen erledigt. Indessen pflegt man sich damit nicht zu begnügen, sondern sucht sich vorzustellen, in welchen chemischen Verbindungen die einzelnen Bestandteile der Substanz vorhanden seien. Derartige weitergehende Annahmen sind natürlich nur discutierbar, so lange sie mit der beweisbaren empirischen Formel in Einklang stehen.

11. Die spezielle Fahlerzformel.

Satz II legt die Deutung nahe, daß in den Fahlerzen isomorphe Mischungen einer Kupfer- und einer Zinkverbindung vorliegen, die unter Berücksichtigung der beiden anderen Sätze folgendermaßen formuliert werden können.



Die Zinkverbindung entspricht also dem gleichfalls regulären Beegerit $\text{Pb}_6\text{Bi}_2\text{S}_9$. Welches ist nun aber die der Formel $\text{Zn}_6\text{Sb}_2\text{S}_9$ entsprechende Molekulargröße der Kupferverbindung? Als Kriterium dieser Frage kann der Begriff »chemische Analogie isomorpher Mischungen« dienen. Es lassen sich gegenwärtig vier Arten oder Stufen chemischer Analogie unterscheiden.

I. Die einander vertretenden »isomorphen« Atomgruppen haben gleiche Valenzensumme und enthalten die gleiche Zahl gleichwertiger Atome.

Apatit	$Ca_5P_3O_{12}F$,	Cölestin	$SrSO_4$,
Mimetesit	$Pb_5As_3O_{12}Cl$,	Anglesit	$PbSO_4$.

II. Die isomorphen Atomgruppen haben gleiche Valenzensumme und enthalten die gleiche Zahl ungleichwertiger Elemente.

Kalkspat	$CaCO_3$,	Albit	$NaAlSi_3O_8$,
Natriumsalpeter	$NaNO_3$,	Anorthit	$CaAl_2Si_2O_8$.

III. Die isomorphen Atomgruppen haben gleiche Valenzensumme und enthalten nicht die gleiche Zahl von Atomen.


Wollastonit	$Ca_3Si_3O_9$,	Scheelit	$Ca^{II}WO_4^{VI}$,
Pektolith	$Ca_2NaHSi_3O_9$,	Ammoniumjodat	$(NH_4^{I}JO_4^{VII})$.

IV. Die isomorphen Atomgruppen haben ungleiche Valenzensumme (?), aber gleiche Zahl von Atomen.

Markasit	FeS_2 ,
Arsenkies	$Fe(As, S)_2$,
Löllingit	$FeAs_2$.

Die Vertretung von Schwefel durch Antimon und Arsen ist nicht sicher.

Nach dieser Charakteristik der »chemischen Analogie« ist die Fahl-
erzformel entsprechend der Stufe III zu schreiben wie folgt:



mit den äquivalenten Atomgruppen (Cu_9Sb_3) und (Zn_6Sb_2) , worin wiederum *Cu* durch *Ag*, *Zn* durch *Fe*, *Pb*, *Hg*, *Mn*, *Ni*, und *Sb* durch *As* und *Bi* vertreten werden kann und *x* bei meinen Analysen etwa von 2 bis 40 variiert und am häufigsten die Werte 3 bis 4 annimmt.

Prior und Spencer (loc. cit.) schreiben in voller Übereinstimmung mit meiner empirischen Formel $Cu_6Sb_3.Sb_2S_3$ und $Zn_6Sb_6.Sb_2S_3$, worin Cu_6S_3 mit Zn_6S_6 isomorph sein soll als »Erweiterung des Gedankens, welcher jetzt Grund zu fassen scheint, daß es in vielen Fällen die Zahl der Atome ist, ohne Rücksicht auf ihren chemischen Wert, welche beim Isomorphismus von Wichtigkeit ist, wie bei $NaAlSi_3O_8$ und $CaAl_2Si_2O_8$ und bei $CaCO_3$ und $NaNO_3$.« Nun haben wir aber schon bei Stufe II gesehen, daß gerade in diesen Beispielen der chemische Wert der Atome sehr wohl von Einfluß ist. Der Prior-Spencer'sche Gedankengang entspräche eher unserer Stufe IV, für die es sehr schwer hält, Beispiele zu finden und die stark problematisch ist. Endlich ist kein Grund ersichtlich, der dazu berechtigte, diese »Erweiterung« vorzunehmen, d. h. eine neue Stufe chemischer Analogie aufzustellen, die weder Äquivalenz noch gleiche Atomzahl aufweist.

Ich möchte an dieser Stelle vergleichsweise die chemische Zusammensetzung des rhombischen Stylotyps erwähnen, die meist fälschlicherweise

als die eines silberreichen Antimonfahlerzes angegeben wird. v. Kobell's Analyse (Ber. Akad. Wiss. München 1865, 1, 463) ergab:

<i>Cu</i>	28,00	4404	} 5169	2,03	} 2,52	12,4
<i>Ag</i>	8,30	768				—
<i>Fe</i>	7,00	1252	—	0,49		3,0
<i>Sb</i>	30,53	2539	—	1,00	—	6,0
<i>S</i>	24,30	7579	—	3,00	—	18,2

Für ein Fahlerz ist also zu viel Antimon vorhanden. Vielmehr ergibt sich als Stylotypformel in ungezwungenster Weise $2(\text{Cu}, \text{Ag})_6\text{Sb}_2\text{S}_6 + \text{Fe}_3\text{Sb}_2\text{S}_6$, wie auch allgemein angenommen wird. Aus dem Umstande, daß die Verbindung $\text{Cu}_6\text{Sb}_2\text{S}_6$ im Stylotyp isomorph mit $\text{Fe}_3\text{Sb}_2\text{S}_6$ erscheint, glaube ich schließen zu dürfen, daß sie wahrscheinlich im Fahlerz nicht auch mit $\text{Fe}_6\text{Sb}_2\text{S}_9$ isomorph sein werde, wie Prior und Spencer annehmen.

Zum Vergleich sei bemerkt, daß Liebisch (Ber. Akad. Wiss. Berlin 1910, 20, 369) nach Niederschrift dieser Abhandlung die Silberantimonide in die reguläre Verbindung Ag_6Sb und die rhombische Ag_3Sb getrennt hat. Es dürfte wohl kaum auf Zufall beruhen, daß gerade die Valenzensumme der regulären Gruppe Zn_6Sb_2 des Fahlerzes doppelt so groß ist als die des regulären Silberantimonides Ag_6Sb , während die Valenzensumme der rhombischen Gruppe $(\text{Cu}, \text{Ag})_6\text{Sb}_2$, die ich dem Stylotyp zugewiesen habe, doppelt so groß ist als die des rhombischen Silberantimonides Ag_3Sb .

Da man in neuerer Zeit geneigt ist, chemische Molekel und Krystallmolekel als identisch anzusehen, so darf ich hier vielleicht auf eine mögliche Beziehung zwischen Krystallbau und Formel hinweisen. Nach der Theorie der Krystallstructur sind die Elementarparallelepipede des regulären Systems der Würfel mit acht, der centrierte Würfel mit neun und der Würfel mit centrierten Flächen mit 14 Punkten. Die Ebenen maximaler Punktdichte oder Spaltungsebenen sind im Falle des Aufbaues eines Krystalls aus centrierten Würfeln die Rhombendodekaëderflächen. Die tetraëdrische Zinkblende spaltet nach dem Rhombendodekaëder, ist also aus centrierten Würfeln struiert zu denken. Sollte die gleiche Krystallform der Fahlerze auf die gleiche Structur deuten, so würde man an eine Beziehung der Formeln $\text{S}_9\text{Sb}_3\text{Cu}_9$ und $\text{S}_9\text{Sb}_2\text{Zn}_6$ zu den neun Punkten des centrierten Würfels denken können.

Ich komme nun auf die Besprechung früherer Auffassungen zurück, nachdem ich durch die in meiner empirischen Formel enthaltenen drei Sätze einen festen Standpunkt gewonnen habe. Durch Satz I wird die Annahme H. Rose's, in den Fahlerzen würde Cu_2S durch ZnS isomorph vertreten, endgültig widerlegt. Denn jeder derartige Ersatz von Cu_2 durch Zn würde das constante Verhältniß 3 : 4 stören.

Petersen's Formel $(\text{Cu}_2, \text{Zn})_3(\text{Sb}, \text{As})_2\text{S}_6$ ist natürlich nicht etwa mit

meiner empirischen Fahlerzformel $(\overset{\text{I}}{M_x}, \overset{\text{II}}{M_y})_3 \overset{\text{III}}{MS}_3 + \frac{y}{2}$, sondern mit der Stylo-
typformel identisch.

Tschermak's empirische Formel $Cu_{10}Zn_2Sb_4S_{13}$ stellt tatsächlich eines
der häufigsten Verhältnisse dar. Jedoch fehlt es seinen Componenten an
jeder chemischen Analogie und, indem er sein $CuZn_2SbS_4$ durch $CuCu_4AsS_4$
vertreten läßt, verstößt er gegen das constante Verhältniß 3 : 4.

Zu der Formel der Herren Prior und Spencer habe ich bereits
Stellung genommen. Die Frage nach der Schreibweise der speciellen Fah-
lerzformel, in der ich von ihnen abweiche, kann experimentell zurzeit nicht
entschieden werden. Als besonderes Verdienst von Prior und Spencer
möchte ich es ansehen, daß sie sich als die ersten von der öfters er-
wähnten, schon als selbstverständlich geltenden Annahme Rose's über den
Ersatz von Cu_2S durch ZnS , wie man sieht, mit bestem Erfolge frei-
gemacht haben.

Lebenslauf.

Ich, Alfons Kretschmer, katholischer Religion, Sohn des Hauptlehrers em. Franz Kretschmer und seiner verstorbenen Ehefrau Anna, geb. Kleindorf, wurde am 8. November 1883 zu Preiland, Kreis Neisse, geboren. Ich besuchte die heimatliche Volksschule und das Königl. Gymnasium zu Neisse, welches ich Ostern 1904 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Hierauf widmete ich mich in Tübingen und seit October 1904 in Breslau dem Studium der Medicin, das ich Ostern 1905 mit dem der Naturwissenschaften vertauschte. Vorliegende Arbeit fertigte ich in den Jahren 1908—1910 im chemischen Laboratorium des mineralogischen Instituts an.

Während meiner Studienzeit besuchte ich die Vorlesungen folgender Herren Professoren und Docenten:

Baumgartner, Gürich, Hasse, Hegelmeier, Heidenhain, Herz, Hintze, Kneser, Kükenthal, Ladenburg, Lummer, Paschen, Pax, Rosanes, Rosen, Sachs, Sackur, Schaefer, Strecker, Sturm, Volz, v. Vöchting.

Allen meinen hochverehrten Lehrern, insbesondere Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hintze, dem ich die Anregung zu dieser Arbeit, sowie mannigfache Förderung verdanke, statue ich meinen herzlichsten Dank ab.